

# 化学療法レジメンセット登録用紙

|        |                  |      |              |
|--------|------------------|------|--------------|
| 領域     | 消化器がん            | ルート  | リザーバー        |
| 適応     | 食道がん             |      |              |
| No(3桁) | 002              | CODE | 001001001002 |
| 診療科    | 消化器内科            | 医師   | 畑中           |
| セット名称  | 5-FU+CDDP【イメド併用】 |      |              |
| 申請年月日  | 平成22年6月7日        |      |              |
| 緊急     |                  | 通常   | ●            |

|          |     |                       |
|----------|-----|-----------------------|
| 抗癌剤名称    | 手技  | 標準投与量                 |
| シスプラチン   | DIV | 80 mg/m <sup>2</sup>  |
| フルオロウラシル | DIV | 800 mg/m <sup>2</sup> |
|          |     |                       |
|          |     |                       |
|          |     |                       |
|          |     |                       |

|      |      |    |    |     |     |
|------|------|----|----|-----|-----|
| Aポート | Vポート | 末梢 | 確認 |     |     |
|      | ●    |    | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
|      |      |    |    |     |     |

| 投与順 | Rp  | 投与時間        | 投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |   |             | -1  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1   | ラクテック 1000mL<br>手技: 静脈内 経路:                           | 22時間<br>DIV | ●   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | ソルデム1 1000mL+ソルデム3A 1000mL<br>手技: 静脈内 経路:             | 24時間<br>DIV |   | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | 生食 100mL+アロキシ 0.75mg+デキサート6.6mg<br>手技: 静脈内 経路:【イメド併用】 | 30分<br>DIV  |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | 生食 500mL+シスプラチン( )mg<br>手技: 静脈内 経路:トータルで650mLを越えない    | 2時間<br>DIV  |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | 生食 500mL+フルオロウラシル( )mg<br>手技: 静脈内 経路:                 | 24時間<br>DIV |   | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | ヘパリンNaロックシリンジ 1筒<br>手技: 静脈内 経路:                       | IV          |   |   |   |   |   |   | ● |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | 手技: 経路:   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | 手技: 経路:   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | 手技: 経路:   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | 手技: 経路:   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |