

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	018	CODE	001002001018
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	★2回目以降: Trastuzumab+XP【イメト併用】		
申請年月日	平成30年9月3日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シスプラチン	DIV	80 mg/m ²
カペシタビン	PO	2000 mg/m ²
トラスツズマブ: 2回目以降	DIV	6 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日) 《 》 クール																													
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	ソルデム1 1000mL 手技: 静脈内 経路:	22時間 DIV	●																													
2	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用			●																												
3	トラスツズマブ ()mg+注射用水 20mL+ 生食 250mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																												
4	生食 100mL+アロキシ 0.75mg+デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: 【イメト併用】	30分 DIV		●																												
5	ラクテック 500mL+メクロプラミド 10mg 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●	●	●																										
6	生食 500mL+シスプラチン ()mg 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●																												
7	ソルデム3A 500mL+フロセミド 10mg 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●	●	●																										
8	ソルデム1 1500mL+ビタミン 1V+メクロプラミド 20mg 手技: 静脈内 経路:	24時間 DIV		●	●	●																										
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV				●																										
10	カペシタビン ()mg 手技: 内服 経路:	1日2回 PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															