

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	035	CODE	001002001035
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	5-FU+I-LV		
申請年月日	平成28年5月30日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
レボホリナート	DIV	250 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	600 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

				投与スケジュール: (6 投 2 休) or (投与間隔 56 日) 《 》 クール																											
Day 1~28																															
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●							●							●							●						
2	生食 500mL+レボホリナート()mg 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●							●							●							●						
3	生食 20mL+フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路: レボホリナート開始1時間後	5分 IV		●							●							●							●						
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: 終了時	IV		●							●							●							●						
Day 29~56																															
投与順	Rp	投与時間		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●							●							●							●						
2	生食 500mL+レボホリナート()mg 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●							●							●							●						
3	生食 20mL+フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路: レボホリナート開始1時間後	5分 IV		●							●							●							●						
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: 終了時	IV		●							●							●							●						