

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	041	CODE	000041
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	mFOLFOX6【輸液ポンプ】【イメド併用】		
申請年月日	平成29年2月27日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オキサリプラチン	DIV	85 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日) 《 》 クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバッグ 50mL+デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:【イメンド併用】	30分 DIV		●														●													
2	5%ブドウ糖 250mL+オキサリプラチン ()mg 手技: 静脈内 経路:レボホリナートと同時に	2時間 DIV		●														●													
3	5%ブドウ糖 250mL+レボホリナート ()mg 手技: 静脈内 経路:オキサリプラチンと同時に	2時間 DIV		●														●													
4	5%ブドウ糖 20mL+フルオロウラシル ()mg 手技: 静脈内 経路:2、3終了後すぐに	3分 IV		●														●													
5	生食 250mL+フルオロウラシル ()mg 手技: 静脈内 経路:輸液ポンプ	46時間 CIV		●														●													
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●														●													
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														