

# 化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

|        |               |      |              |
|--------|---------------|------|--------------|
| 領域     | 消化器がん         | ルート  | リザーバー        |
| 適応     | 胃がん           |      |              |
| No(3桁) | 042           | CODE | 001002001042 |
| 診療科    | 消化器内科         | 医師   | 畑中           |
| セット名称  | HGCSG1502RPMI |      |              |
| 申請年月日  | 平成29年6月12日    |      |              |
| 緊急     | ●             | 通常   |              |

|          |     |                       |
|----------|-----|-----------------------|
| 抗癌剤名称    | 手技  | 標準投与量                 |
| レボホリナート  | DIV | 250 mg/m <sup>2</sup> |
| フルオロウラシル | IV  | 600 mg/m <sup>2</sup> |
|          |     |                       |
|          |     |                       |
|          |     |                       |
|          |     |                       |

|      |      |    |    |     |     |
|------|------|----|----|-----|-----|
| Aポート | Vポート | 末梢 | 確認 |     |     |
|      | ●    |    | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
|      |      |    |    |     |     |

|           |                                                   |            | 投与スケジュール: ( 6 投 2 休 ) or ( 投与間隔 56 日 ) 《 》 クール |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Day 1~28  |                                                   |            |                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 投与順       | Rp                                                | 投与時間       | -1                                             | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1         | グラニセトロンバック 50mL<br>手技: 静脈内 経路:                    | 30分<br>DIV |                                                | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |
| 2         | 生食 500mL+レボホリナート ( )mg<br>手技: 静脈内 経路:             | 2時間<br>DIV |                                                | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |
| 3         | 生食 20mL+フルオロウラシル ( )mg<br>手技: 静脈内 経路:レボホリナート投与終了後 | 5分<br>IV   |                                                | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |
| 4         | ヘパリンNaロックシリンジ 1本<br>手技: 静脈内 経路:終了時                | IV         |                                                | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |
| Day 29~56 |                                                   |            |                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 投与順       | Rp                                                | 投与時間       |                                                | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 1         | グラニセトロンバック 50mL<br>手技: 静脈内 経路:                    | 30分<br>DIV |                                                | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2         | 生食 500mL+レボホリナート ( )mg<br>手技: 静脈内 経路:             | 2時間<br>DIV |                                                | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3         | 生食 20mL+フルオロウラシル ( )mg<br>手技: 静脈内 経路:レボホリナート投与終了後 | 5分<br>IV   |                                                | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4         | ヘパリンNaロックシリンジ 1本<br>手技: 静脈内 経路:終了時                | IV         |                                                | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |