

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	056	CODE	001002001056
診療科	消化器内科	医師	畠中
セット名称	Nivolumab+FOLFOX6		
申請年月日	令和 3 年 12月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	240 mg/body
オキサリプラチン	DIV	85 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

※ HER2陰性

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日) 《 》 クール																															
			Total時間入力	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																												
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:インラインフィルター使用/ブライミング用	IV			●																												●	
2	オプジーボ 240mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																												●	
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV			●																												●	
4	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:【イメント併用】	30分 DIV			●																												●	
5	オキサリプラチン ()mg +5%ブドウ糖 250mL 手技:静脈内 経路:レボホリナートと同時に	2時間 DIV			●																												●	
6	レボホリナート ()mg +5%ブドウ糖 250mL 手技:静脈内 経路:オキサリプラチンと同時に	2時間 DIV			●																												●	
7	フルオロウラシル ()mg +5%ブドウ糖 20mL 手技:静脈内 経路:Rp5.6終了後すぐに	3分 IV			●																												●	
8	フルオロウラシル ()mg +生食 手技:静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV			●																												●	
9	ヘパリンNaロックシリング 1本 手技: 経路:	IV			●																												●	
10	手技: 経路:																																	