

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	002	CODE	001003001002
診療科	消化器内科	医師	畠中
セット名称	FOLFIRI		
申請年月日	平成22年6月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イリノテカン	DIV	150 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認
	●		

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (1 投 1 休) or (Interval日数 14 日)《 》クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	生食100mL+アロキシ 0.75mg+デキサート6.6mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																										
2	生食500mL+イリノテカン()mg 手技:静脈内 経路:レボホリナートと同じに	2時間 DIV			●																●									
3	生食250mL+レボホリナート()mg 手技:静脈内 経路:イリノテカンと同じに	2時間 DIV			●																●									
4	生食20mL+フルオロウラシル()mg 手技:静脈内 経路:2. 3終了後すぐに	3分 IV		●																	●									
5	生食20mL 3A+フルオロウラシル()mg 手技:静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV			●																●									
6	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路:			●																	●									
7	手技: 経路:																													
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													