

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	006	CODE	001003001006
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	★Avastin+mFOLFOX6【イメド併用】		
申請年月日	平成22年6月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アバスタチン	DIV	5 mg/kg
オキサリプラチン	DIV	85 mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	DIV	200 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	IV	400 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: ( 1 投 1 休 ) or (Interval日数 14 日) 《 》 クール																														
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	生食 50mL 手技: 経路:プライミング用			●															●														
2	生食 100mL+アバスタチン ( )mg 手技: 静脈内 経路:	90~30分 DIV		●															●														
3	グラニセトロンBG 50mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路:【イメド併用】	30分 DIV		●															●														
4	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン( )mg 手技: 静脈内 経路:レボホリナートと同じに	2時間 DIV		●															●														
5	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート( )mg 手技: 静脈内 経路:オキサリプラチンと同じに	2時間 DIV		●															●														
6	5%ブドウ糖20mL+フルオロウラシル( )mg 手技: 静脈内 経路:4、5終了後すぐに	3分 IV		●															●														
7	生食20mL 3A+フルオロウラシル( )mg 手技: 静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV		●															●														
8	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路:			●															●														
9	手技: 経路:																																
10	手技: 経路:																																