

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	022	CODE	001003001022
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	初回: Erbitux+mFOLFOX6【イメンド併用】		
申請年月日	平成23年10月11日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アービタックス	DIV	初回400 mg/m ²
		250 mg/m ²
オキサリプラチン	DIV	85 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日)《 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンBG 50mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路:【イメンド併用】	30分 DIV		●														●													
2	グラニセトロンBG 50mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV									●															●					
3	生食50mL 手技: 経路:	10分 DIV		●							●							●								●					
4	生食500mL+アービタックス ()mg 手技: 静脈内 経路:レスタミンコーワ錠服用30分後よ	120分 DIV		●																											
5	生食250mL+アービタックス ()mg 手技: 静脈内 経路:レスタミンコーワ錠服用30分後よ	60分 DIV									●															●					
6	5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●							●							●								●					
7	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン()mg 手技: 静脈内 経路:レボホリナートと同じに	2時間 DIV		●														●													
8	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート()mg 手技: 静脈内 経路:オキサリプラチンと同じに	2時間 DIV		●														●													
9	5%ブドウ糖20mL+フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路:7、8終了後すぐに	3分 IV		●														●													
10	生食20mL 3A+フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV		●														●													
11	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路:	IV		●							●							●								●					