化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No（3桁）	023	CODE	001003001023
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	2回目以降：Erbitux+mFOLFOX6【ｲﾒﾝﾄﾞ併用】		
申請年月日	平成23年10月11日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アービタックス	DIV	250 mg/㎡
オキサリプラチン	DIV	85 mg/㎡
レボホリナート	DIV	200 mg/㎡
フルオロウラシル	IV	400 mg/㎡
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/㎡

Aポート	Vポート	末梢	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

投与スケジュール：（　投　休）or（Interval日数　日）《　》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンBG　50mL+デキサート6.6mg 手技：静脈内　経路：【イメンド併用】	30分 DIV		●														●													
2	グラニセトロンBG　50mL+デキサート6.6mg 手技：静脈内　経路：	30分 DIV									●														●						
3	生食50mL 手技：　経路：	10分 DIV		●							●							●							●						
4	生食250mL+アービタックス　（　）mg 手技：静脈内　経路：ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ5錠服用30分後より	60分 DIV		●	全量で250mLにする						●							●							●						
5	5%ブドウ糖100mL 手技：静脈内　経路：	60分 DIV		●							●							●							●						
6	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン（　）mg 手技：静脈内　経路：レボホリナートと同じに	2時間 DIV		●														●													
7	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート（　）mg 手技：静脈内　経路：オキサリプラチンと同じに	2時間 DIV		●														●													
8	5%ブドウ糖20mL+フルオロウラシル（　）mg 手技：静脈内　経路：6、7終了後すぐに	3分 IV		●														●													
9	生食20mL　3A+フルオロウラシル（　）mg 手技：静脈内　経路：トレフューザー	46時間 CIV		●														●													
10	ヘパリンNa　1筒 手技：　経路：	IV		●							●							●							●						

レジメ検討委員会