

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	038	CODE	001001001038
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	★RAM+FOLFIRI		
申請年月日	平成28年11月9日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サイラムザ	DIV	8 mg/kg
イリノテカン	DIV	150 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 開始時にレスタミンコーワ5錠服用 ※ インラインフィルター使用

※ RAMの投与速度25mg/minを超えない

投与スケジュール: (1 投 1 休) or (Interval日数 14 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 100mL+アロキシ 0.75mg+デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●														●													
2	生食 50mL 手技: 経路:	15分 DIV		●														●													
3	生食 250mL+サイラムザ ()mg 手技: 静脈内 経路: Total 250mL	60分 DIV		●														●													
4	生食 50mL 手技: 経路:	15分 DIV		●														●													
5	生食 500mL+イリノテカン ()mg 手技: 静脈内 経路: レボホリナートと同時に	2時間 DIV		●														●													
6	生食 250mL+レボホリナート ()mg 手技: 静脈内 経路: イリノテカンと同時に	2時間 DIV		●														●													
7	生食 20mL+フルオロウラシル ()mg 手技: 静脈内 経路: 5.6終了後すぐに	3分 IV		●														●													
8	生食 20mL 3A+フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路: トレフューザー	46時間 CIV		●														●													
9	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路:	IV		●														●													
10	手技: 経路:																														