

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	047	CODE	001003001047
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	初回: Erbitux+FOLFIRI		
申請年月日	令和3年1月18日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アービタックス	DIV	初回400 mg/m ²
		250 mg/m ²
イリノテカン	DIV	200 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 日) 《 》 クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 100mL +アロキシ 0.75mg +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●														●													
2	グラニセトロンバッグ 1mg + デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV									●														●						
3	生食 50mL 手技: 経路:	10分 DIV		●							●							●							●						
4	生食 500mL +アービタックス ()mg 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ錠服用30分後より	120分 DIV		●																											
5	生食 250mL +アービタックス ()mg 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ錠服用30分後より	60分 DIV									●														●						
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●							●							●							●						
7	生食 500mL +イリノテカン()mg 手技: 静脈内 経路: レボホリナートと同じに	2時間 DIV		●														●													
8	生食 250mL +レボホリナート()mg 手技: 静脈内 経路: イリノテカンと同じに	2時間 DIV		●														●													
9	生食 20mL +フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路: 7、8終了後すぐに	3分 IV		●														●													
10	生食 20mL 3A +フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路: トレフューザー	46時間 CIV		●														●													
11	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路:	IV		●							●							●							●						