

# 化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	048	CODE	001003001048
診療科	消化器内科		
セット名称	2回目以降:Erbitux+FOLFIRI		
申請年月日	令和3年1月18日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アービタックス	DIV	250 mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン	DIV	200 mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	DIV	200 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	IV	400 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認
	●		

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or ( 投与間隔 日 ) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 100mL +アロキシ 0.75mg +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
2	グラニセトロンバッグ 1mg +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV														●															
3	生食 50mL 手技: 経路:	10分 DIV			●											●					●										
4	生食 250mL +アービタックス ( )mg 手技:静脈内 経路:レスタンコーア5錠服用30分後より	60分 DIV														●				●											
5	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●											●					●										
6	生食 500mL +イリノテカン( )mg 手技:静脈内 経路:レボホリナートと同じに	2時間 DIV			●															●											
7	生食 250mL +レボホリナート( )mg 手技:静脈内 経路:イリノテカンと同じに	2時間 DIV			●														●												
8	生食 20mL +フルオロウラシル( )mg 手技:静脈内 経路:7、8終了後すぐに	3分 IV			●														●												
9	生食 20mL 3A +フルオロウラシル( )mg 手技:静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV			●														●												
10	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路:	IV			●											●				●											