

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	003	CODE	002001001003
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	FEC100【イモト併用】		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	500 mg/m ²
エピルビシン塩酸塩	DIV	100 mg/m ²
フルオロウラシル	DIV	500 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※平成22年9月15日よりアロキシに変更

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21~28日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 100mL+アロキシ 0.75mg+デキサート 8.25mg 手技: 静脈内 経路:【イモト併用】	30分 DIV		●																											
2	生食 50mL+エピルビシン塩酸塩()mg 手技: 静脈内 経路:	15分以内 DIV		●																											
3	生食 250mL+エンドキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	90分 DIV		●																											
4	生食 50mL 手技: 経路: プライミング用			●																											
5	生食 50mL+フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路: エンドキサン投与開始後	15分以内 DIV		●																											
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●																											
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														