

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【AML】急性骨髄性白血病		
No(3桁)	011	CODE	004002001011
診療科	内科	医師	堤
セット名称	FLAG-M		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
フルダラ	DIV	15 mg/m ²
シタラビン	DIV	2000 mg/m ²
ノバントロン	DIV	10 mg/m ²
フルダラ	DIV	15 mg/m ²
シタラビン	DIV	2000 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	シタラビン()mg + 5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: 2:00(36・60・84・108)	3時間 DIV					●	●	●	●																					
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 9:30	30分 DIV			●	●	●	●																							
3	フルダラ()mg+注射用水+生食100mL (AraCの4hr前) 手技: 静脈内 経路: 10:00(20・44・68・92)	30分 DIV			●	●	●	●																							
4	ノバントロン()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路: 14:00(72・96・120)	30分 DIV						●	●	●																					
5	シタラビン()mg + 5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: 14:00(24・48・72・96)	3時間 DIV			●	●	●	●																							
6	G-CSF()μg 手技: 皮下注 経路: 14:00(0・24・48・72)	SC		●	●	●	●																								
7	ソルデム3A 1000ml 手技: 静脈内 経路: 14:00(0・24・48・72・96・120)	24時間 CIV		●	●	●	●	●	●																						
8	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 21:30	30分 DIV			●	●	●	●																							
9	フルダラ()mg+注射用水+生食100mL (AraCの4hr前) 手技: 静脈内 経路: 22:00(32・56・80・104)	30分 DIV			●	●	●	●																							
10	手技: 経路:																														