

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【AML】急性骨髄性白血病		
No(3桁)	028	CODE	004002001028
診療科	内科	医師	堤
セット名称	☆AraC+IDR+Sorafenib寛解導入		
申請年月日	平成23年5月27日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シタラビン	CIV	1500 mg/m ²
イダマイシン	DIV	12 mg/m ²
ネクサバール	p.o	800 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

非寛解時は再導入可

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																																									
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
1	ネクサバール1日800mg 手技: 経路:			●	●	●	●	●	●	●	朝夕食前・間(高脂肪食非摂取時は食後可)																																	
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●																																					
3	イダマイシン()mg + 生食100ml 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●	●	●																																						
4	シタラビン()mg + 生食500ml 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	60歳以上の場合3日間																																				
5	ソルデム3A 1000ml 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●																																					
6	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:シタラビン点滴終了後に	IV							●																																			
7	手技: 経路:																																											
8	手技: 経路:																																											
9	手技: 経路:																																											
10	手技: 経路:																																											