

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【AML】急性骨髄性白血病		
No(3桁)	029	CODE	004002001029
診療科	内科	医師	堤
セット名称	☆AraC+IDR+Sorafenib地固め		
申請年月日	平成23年5月27日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シタラビン	CIV	750 mg/m <sup>2</sup>
イダマイシン	DIV	8 mg/m <sup>2</sup>
ネクサバル(D1~28)	p.o	800 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: ( 1クール4~6週 ) or (Interval日数 日) 《 5 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ネクサバル1日800mg(高脂肪食非摂取時は食後可) 手技: 経路:	朝夕食前・間		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	グラニセロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●																									
3	イダマイシン( )mg + 生食100ml 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●	●																										
4	シタラビン( )mg + 生食500ml 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●																									
5	ソルデム3A 1000ml 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●																									
6	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:シタラビン点滴終了後に	IV					●																								
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														