

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【APL】急性前骨髄性白血病		
No(3桁)	008	CODE	004003001008
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★APL205R Induction		
申請年月日	平成22年9月27日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
トリセノクス注(CRまで投与)	DIV	0.15 mg/kg
イダマイシン(必要に応じ)	DIV	12 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用	30分 DIV		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	トリセノクス注()mg + 5%ブドウ糖250ml 手技: 静脈内 経路: 午前	2時間 DIV		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: イダマイシンの30分前に	30分 DIV		(●)	(●)																									
5	イダマイシン()mg + 生食100ml 手技: 静脈内 経路: 午後(IDRと同時投与しない)	30分 DIV		(●)	(●)																									
6	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		(●)	(●)																									
7	手技: 経路:																													
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													