

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	002	CODE	004005001002
診療科	内科	医師	堤
セット名称	Ph1+ALL202 C1		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート(1hr)	DIV	100 mg/m ²
メソトレキセート(23hr)	DIV	900 mg/m ²
シタラビン	DIV	2000 mg/m ²
シタラビン	DIV	2000 mg/m ²
ロイコボリン	IV	15 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●																									
2	ソルメルコート()mg + 生食 20mL 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●																									
3	メソトレキセート()mg + 生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●																											
4	メソトレキセート()mg + 生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 3に引き続き投与	23時間 DIV		●																											
5	シタラビン()mg + 5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路:	3時間 DIV				●	●																								
6	グラニセロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 1の12時間後に投与	30分 DIV		●	●	●																									
7	ソルメルコート(50)mg + 生食 20mL 手技: 静脈内 経路: 2の12時間後に投与	IV		●	●	●																									
8	シタラビン()mg + 5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路: 5の12時間後に投与	3時間 DIV				●	●																								
9	ソルデム3A 1000mL + ソルデム1 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●																									
10	ロイコボリン 15mg 手技: 静脈内 経路: 3開始36hr後から6hr毎に8回	IV			①	④	③																								