

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	004	CODE	004005001004
診療科	内科	医師	堤
セット名称	ALL202寛解導入		
申請年月日	平成21年9月28日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	1200 mg/m <sup>2</sup>
ダウノマイシン	DIV	60 mg/m <sup>2</sup>
オンコビン	DIV	1.3 mg/m <sup>2</sup>
ロイナーゼ	DIV	3000 単位/m <sup>2</sup>
プレドニン	p.o	60 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	プレドニン錠 5mg (朝 -昼 -夕 )錠 手技:経口 経路:	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	グラニセトロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●				●							●													●	
3	オンコビン( )mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●						●							●													●	
4	ダウノマイシン( )mg + 生食 100mL 手技:静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●																									
5	エンドキサン( )mg + 生食250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV		●																											
6	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:	6時間 DIV		●	●	●																									
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用	IV																													
8	ロイナーゼ( )U +注射用水 +5%ブドウ糖250mL 手技:静脈内 経路:1Vを注射用水5mLで溶解、フィルター付の輸液セットを使用	2時間 DIV																													
9	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路:点滴後	IV																													
10	手技: 経路:																														