

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	007	CODE	004005001007
診療科	内科	医師	堤
セット名称	ALL202 C2(ArmB MTX中等量)		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート(2hr)	DIV	100 mg/m ²
メソトレキセート(22hr)	DIV	400 mg/m ²
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.3 mg/m ²
ロイケリン	経口	25 mg/m ²
ロイコボリン	IV	15 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ロイケリン散()mg 手技:経口 経路:	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	グラニセトロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●													●													
3	オンコビン()mg + 生食50ml 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●													●													
4	メソトレキセート()mg + 生食100ml 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV		●													●													
5	メソトレキセート()mg + 生食500ml 手技:静脈内 経路:	22時間 DIV		●													●													
6	ロイコボリン 15mg 手技:静脈内 経路:4開始36hr後から6hr毎に8回	IV				①	④	③											①	④	③									
7	ソルデム3A 1000mL + ラクテック1000mL 手技:静脈内 経路:	24時間 CIV		●													●													
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													