

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	013	CODE	004005001013
診療科	内科	医師	堤
セット名称	Phi+ALL208IMA C2		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	1200 mg/m ²
ダウノマイシン	DIV	60 mg/m ²
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.3 mg/m ²
プレドニン	p.o	60 mg/m ²
グリベック(Day2~21)	p.o	600 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グリベック錠 100mg 6錠(Day2~21) 手技:経口 経路:	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	プレドニン錠 5mg ()錠 手技:経口 経路:	経口		●	●	●	●	●	●	●																					
3	グラニセトロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
4	オンコビン()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
5	ダウノマイシン()mg + 生食 100mL 手技:静脈内 経路:	1時間 DIV		●																											
6	エンドキサン()mg + 生食 250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV		●																											
7	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:	6時間 DIV		●																											
8	手技: 経路:																														
19	手技: 経路:																														
20	手技: 経路:																														