

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	015	CODE	004005001015
診療科	内科	医師	堤
セット名称	L-AdVP		
申請年月日	平成22年9月28日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ドキソルビシン	DIV	20 mg/m <sup>2</sup>
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.4 mg/m <sup>2</sup>
プレドニン(Day1~28)	p.o	40 mg/m <sup>2</sup>
ロイナーゼ	DIV	4000 単位/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	プレドニン錠5mg( )錠 (朝 -昼 -夕 錠服用) 手技: 経路:	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●				●							●	●	●					●						
3	生食50mL+オンコビン( )mg 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●						●							●							●						
4	生食100mL+ドキソルビシン( )mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●											●	●	●											
7	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:点滴後	IV		●	●	●				●							●	●	●					●						
8	生食 50mL 手技: 経路:プライミング用	IV															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	ロイナーゼ( )KU+注射用水( )mL+5%ブドウ糖250mL 手技: 経路:1Vを注射用水5mLで溶解、フィルター付輸液セットを使用	2時間 DIV															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:点滴後	IV		●	●	●				●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													