



# 化学療法レジメンセット登録用紙

|        |                |      |              |
|--------|----------------|------|--------------|
| 領域     | 血液腫瘍           | ルート  | リザーバー        |
| 適応     | 【ALL】急性リンパ性白血病 |      |              |
| No(3桁) | 018            | CODE | 004005001018 |
| 診療科    | 内科             | 医師   | 堤            |
| セット名称  | ALL87寛解導入      |      |              |
| 申請年月日  | 平成21年9月28日     |      |              |
| 緊急     |                | 通常   | ●            |

|                |      |                        |
|----------------|------|------------------------|
| 抗癌剤名称          | 手技   | 標準投与量                  |
| ドキシソルビシン       | DIV  | 20 mg/m <sup>2</sup>   |
| オンコビン(Max2mg)  | DIV  | 1.3 mg/m <sup>2</sup>  |
| プレドニン(Day1~29) | p.o. | 40 mg/m <sup>2</sup>   |
| エンドキサン         | DIV  | 600 mg/m <sup>2</sup>  |
| ロイナーゼ          | DIV  | 6000 単位/m <sup>2</sup> |

|      |      |    |    |     |     |
|------|------|----|----|-----|-----|
| Aポート | Vポート | 末梢 | 確認 |     |     |
|      | ●    |    | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
|      |      |    |    |     |     |

| 投与順 | Rp  | 投与時間       | 投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日)《 》クール |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|---|------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |   |            | 29  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 11  | グラニセトロンバック 50mL<br>手技: 静脈内 経路:                        | 30分<br>DIV | ●   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12  | オンコビン( )mg+生食50mL<br>手技: 静脈内 経路:                      | 15分<br>DIV | ●   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13  | ドキシソルビシン( )mg+生食100mL<br>手技: 静脈内 経路:                  | 30分<br>DIV | ●   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  | エンドキサン( )mg+生食250mL<br>手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終       | 1時間<br>DIV | ●   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15  | ソルデム3A 1000mL<br>手技: 静脈内 経路:                          | 6時間<br>DIV | ●   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16  | ヘパリンNa 1筒<br>手技: 静脈内 経路:                              | IV         | ●   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17  | 生食 50mL<br>手技: 静脈内 経路: プライミング用                        | IV         | ●   | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18  | ロイナーゼ( )mg+注射用水+5%ブドウ糖250mL<br>手技: 経路: フィルター付輸液セットを使用 | 3時間<br>DIV | ●   | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19  | ヘパリンNa 1筒<br>手技: 静脈内 経路:                              | IV         | ●   | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20  | 手技: 経路:   |            |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |