



# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	019	CODE	004005001019
診療科	内科	医師	堤
セット名称	ALL87(THP)寛解導入		
申請年月日	平成21年9月28日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ピノルビン	DIV	20 mg/m <sup>2</sup>
オンコビン(Max2mg)	DIV	1.3 mg/m <sup>2</sup>
プレドニン(Day1~29)	p.o.	40 mg/m <sup>2</sup>
エンドキサン	DIV	600 mg/m <sup>2</sup>
ロイナーゼ	DIV	6000 単位/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
11	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV	●																											
12	オンコビン( )mg+生食50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV	●																											
13	ピノルビン( )mg+5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後6時間以内に投与終了すること	30分 DIV																												
14	エンドキサン( )mg+生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV																												
15	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV																												
16	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV	●																											
17	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用	IV	●	●	●																									
18	ロイナーゼ( )mg+注射用水+5%ブドウ糖250mL 手技: 経路: フィルター付の輸液セットを使用	3時間 DIV	●	●	●																									
19	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV	●	●	●																									
20	手技: 経路:																													