

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	021	CODE	004005001021
診療科	内科	医師	堤
セット名称	ALL202-25歳以下 寛解導入		
申請年月日	平成26年4月3日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.5 mg/m ²
ピノルビン	DIV	25 mg/m ²
エンドキサン	DIV	1200 mg/m ²
ロイナーゼ	DIV	6000 単位/m ²
デキサート	DIV	10 mg/m ²
プレドニン	p.o	60 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																															
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	プレドニン錠 5mg (朝 -昼 -夕)錠 手技:経口 経路: 経口			●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	グラニセロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3	ロイナーゼ()U +注射用水 +5%ブドウ糖250mL 手技:静脈内 経路:1Vを注射用水5mLで溶解、フィルター付の輸液セットを使用	4時間 DIV																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路:	IV																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	グラニセロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	デキサート()mg + 生食100mL 手技:静脈内 経路:	1時間 DIV																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	オンコビン()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:L-ASP投与時は12時間あける	15分 DIV																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
8	ピノルビン()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技:静脈内 経路:希釈後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9	エンドキサン()mg + 生食250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV																																
10	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:	6時間 DIV																																

