

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	022	CODE	004005001022
診療科	血液内科	医師	堤
セット名称	ALL202-U Consolidation therapy		
申請年月日	平成26年4月3日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	750 mg/m ²
ピノルビン	DIV	25 mg/m ²
シタラビン	DIV	75 mg/m ²
ロイケリン	p.o	50 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

(※第6～9週分。好中球数が0となった時点でキロサイドを中止し速やかにG-CSFを開始する。ロイケリンはアロプリノール使用時は半量に減量する。)

(※第16～19週分Reconsolidation therapyも同一)

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●																
2	エンドキサン()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV		●							●																				
3	ピノルビン()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV		●	●																										
4	シタラビン()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●																
5	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●																
6	ロイケリン散()mg 手技: 経口 経路:	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														