

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	024	CODE	004005001024
診療科	血液内科	医師	堤
セット名称	ALL202-U Reinduction therapy		
申請年月日	平成26年4月3日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オンコビン(最大2mg)	DIV	1.5 mg/m ²
ピノルビン	DIV	25 mg/m ²
エンドキサン	DIV	500 mg/m ²
ロイナーゼ	DIV	6000 単位/m ²
プレドニン	p.o	40 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

(※第12~15週分。)

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																																	
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																																
2	オンコビン()mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: L-ASP投与時は12時間あける	15分 DIV		●																																
3	ピノルビン()mg + 5%ブドウ糖100mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV		●																																
4	エンドキサン()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV		●																																
5	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●																																
10	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		●																																
6	生理食塩液 50mL 手技: 経路: プライミング用(ロイナーゼ)			●			●			●																										
7	ロイナーゼ()U +注射用水 +5%ブドウ糖250m 手技: 静脈内 経路: 1Vを注射用水5mLで溶解、フィルター付の輸液セットを使用	4時間 DIV		●			●			●				●																						
9	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路: 終了時(ロイナーゼ)	IV		●			●			●				●																						
8	プレドニン()mg 手技: 経口 経路:	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Day15からは漸減																		