

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	026	CODE	004005001026
診療科	内科	医師	堤
セット名称	Clofarabine+CPA		
申請年月日	平成27年1月30日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エボルトラ	DIV	40 mg/m ²
エンドキサン	DIV	200 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ Clofarabineは希釈後濃度0.15~0.4mg/mL

(※ 2.2V以下の場合は生食100にする)

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 28 日)《 》クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	アロキシ 1V 手技: 静脈内 経路: 30秒以上かけてゆっくりIV	IV		●																										
2	生食 50mL 手技: 経路: プライミング用			●	●	●	●																							
3	エボルトラ ()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 単独ルート 経路: 0.2μ mフィルターを使用し混注すること	2hr DIV			●	●	●																							
4	生食 20mL 手技: 経路: フラッシュ用				●	●	●																							
5	エンドキサン ()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: AM分 12時間間隔で	3hr DIV			●	●	●																							
6	エンドキサン ()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: PM分 12時間間隔で	3hr DIV		●	●	●																								
7	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24hr CIV		●	●	●	●																							
8	ヘパリンNaロックシリンジ 手技: 静脈内 経路:	IV							●																					
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													