

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	028	CODE	004005001028
診療科	内科	医師	堤
セット名称	ALL202-U Maintenance therapy②		
申請年月日	平成28年4月1日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.5 mg/m ²
エンドキサン	DIV	600 mg/m ²
ロイナーゼ	DIV	10000 単位/m ²
プレドニン	p.o	40 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※維持療法①～④を4サイクル繰り返す。計16コース行う

※各コース終了から次コース開始の間隔は原則2週間とする

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	プレドニン錠 5mg (朝 -昼 -夕)錠 手技:経口 経路:	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※	以降漸減																
2	グラニセトンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●							●							●																	
3	オンコビン()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:L-ASP投与時は12時間あける	15分 DIV		●							●							●																	
4	エンドキサン()mg + 生食500mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV									●																								
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:終了時	IV		●							●							●																	
6	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用(ロイナーゼ)			●							●							●																	
7	ロイナーゼ()U +注射用水 +5%ブドウ糖250mL 手技:静脈内 経路:1Vを注射用水5mLで溶解、フィルター付の輸液セットを使用	4時間 DIV		●							●							●																	
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:終了時(ロイナーゼ)	IV		●							●							●																	
9	手技: 経路:																																		
10	手技: 経路:																																		