

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	030	CODE	004005001030
診療科	内科	医師	堤
セット名称	ALL202-U Maintenance therapy④		
申請年月日	平成28年4月1日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.5 mg/m <sup>2</sup>
ピノルビン	DIV	25 mg/m <sup>2</sup>
ロイナーゼ	DIV	10000 単位/m <sup>2</sup>
プレドニン	p.o	40 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※維持療法①～④を4サイクル繰り返す。計16コース行う

※各コース終了から次コース開始の間隔は原則2週間とする

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	プレドニン錠 5mg (朝 -昼 -夕 )錠 手技:経口 経路:	経口		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※	以降漸減															
2	グラニセトロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●							●							●																
3	オンコビン( )mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:L-ASP投与時は12時間あける	15分 DIV		●							●							●																
4	ピノルビン( )mg + 5%Glu100mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	1時間 DIV									●																							
5	生理食塩水1A 手技:皮内 経路:皮内反応テスト			●																														
6	ロイナーゼ( )U +注射用水 +5%ブドウ糖250mL 手技:静脈内 経路:1Vを注射用水5mLで溶解、フィルター付の輸液セットを使用	4時間 DIV		●							●							●																
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		