

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	032	CODE	004005001032
診療科	内科	医師	堤
セット名称	Clofarabine+AraC		
申請年月日	平成28年8月4日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エボルトラ	DIV	40 mg/m <sup>2</sup>
シタラビン	DIV	1000 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 希釈後濃度0.15~0.4mg/mL

※ 44.1mg以下の場合生食100mLにする

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
2	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: エボルトラ点滴前に	10分 DIV		●	●	●	●	●																						
3	エボルトラ ( )mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 0.2μ mフィルターを使用し混注すること	2hr DIV		●	●	●	●	●																						
4	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: エボルトラ点滴後に	10分 DIV		●	●	●	●	●																						
5	シタラビン ( )mg + 5%Glu250mL 手技: 静脈内 経路:	3hr DIV		●	●	●	●	●																						
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●																						
7	手技: 経路:																													
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													