

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	040	CODE	004005001040
診療科	内科	医師	堤
セット名称	B-ALL213 寛解導入		
申請年月日	平成29年10月24日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
プレドニン	p.o.	60 mg/m ²
オンコビン(Max2mg)	DIV	1.3 mg/m ²
ダウノマイシン	DIV	45 mg/m ²
エンドキサン	DIV	1200 mg/m ²
ロイナーゼ	DIV	5000 単位/m ²
髄注	IT	MTX15mg+AraC40mg+DEX4mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1	プレドニン()mg (朝 -昼) 手技:経口 経路: 内服		●	●	●	●	●	●	●	●	※45歳未満:28日、45歳以上60歳未満:21日、60歳以上:14日										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	グラニセトロンバッグ50mL 手技:静脈内 経路: DIV	30分									●	●																				●			
3	オンコビン()mg+生食50mL 手技:静脈内 経路: DIV	15分									●																					●			
4	ダウノマイシン()mg+生食100mL 手技:静脈内 経路: DIV	60分									●	●	●																						
5	エンドキサン()mg+生食250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事 DIV	3時間									●																								
6	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路: DIV	6時間									●																								
7	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路: IV										●	●	●																						
8	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用																																		
9	ロイナーゼ()mg+注射用水+5%ブドウ糖250mL 手技: 経路:フィルター付の輸液セットを使用 DIV	4時間																																	
10	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路: IV																																		