## 化学療法レジメンセット登録用紙

| 領域     | 血液腫瘍           | ルート              | リザーバー        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 適応     | 【ALL】急性リンパ性白血病 |                  |              |  |  |  |  |  |  |  |
| No(3桁) | 041            | CODE             | 004005001041 |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療科    | 内科             | 医師               | 伊東           |  |  |  |  |  |  |  |
| セット名称  | Ph(-)          | Ph(-)B-ALL213 C1 |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請年月日  | 令和3年9月6日       |                  |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急     |                | 通常               | •            |  |  |  |  |  |  |  |

| 抗癌剤名称 | 手技  | 標準    | 標準投与量   |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
| シタラビン | DIV | 2000  | mg/m²   |  |  |  |  |  |  |
| エトポシド | DIV | 100   | mg/m²   |  |  |  |  |  |  |
| デキサート | DIV | 33    | mg/body |  |  |  |  |  |  |
| ロイナーゼ | DIV | 10000 | 単位/㎡    |  |  |  |  |  |  |
|       |     |       |         |  |  |  |  |  |  |
|       |     |       |         |  |  |  |  |  |  |

| Aポート Vポート | 末梢 |    | 確認  |     |
|-----------|----|----|-----|-----|
|           |    | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
|           |    |    |     |     |
|           |    |    |     |     |
|           |    |    |     |     |

|     |                          |      | ŧ  | 殳与. | スケ | ジュ | L — . | ル: |   | (   |     | 投  | :  |    | 休  | )  | or   | (找   | 设与   | 間隔 | Ā  |    | E    | 3) ( | (    | >  | クー           | -ル |
|-----|--------------------------|------|----|-----|----|----|-------|----|---|-----|-----|----|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|------|----|--------------|----|
| 投与順 | Rp                       | 投与時間 | -1 | 1   | 2  | 3  | 4     | 5  | 6 | 7 8 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 1 | 6 17 | 7 18 | 19 | 20 | 21 | 22 2 | 23 2 | 4 25 | 26 | 27           | 28 |
| 1   | デキサート 33mg +生食100ml      | 1時間  |    |     | •  |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    | П            |    |
| '   | 手技:静脈内 経路:               | DIV  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 2   | グラニセトロンバック 50mL          | 30分  |    |     | •  |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    | П            |    |
|     | 手技:静脈内 経路:AM分            | DIV  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 3   | シタラビン( )mg + 5%ブドウ糖250ml | 3時間  |    |     | •  |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 3   | 手技:静脈内 経路:AM分            | DIV  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 4   | エトポシド( )mg + 生食 500mL    | 1時間  |    |     | •  |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 4   | 手技:静脈内 経路:               | DIV  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 5   | ソルデム3A 1000mL            | 24時間 |    |     | •  |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
|     | 手技:静脈内 経路:               | CIV  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 6   | グラニセトロンバック 50mL          | 30分  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
|     | 手技:静脈内 経路:PM分            | DIV  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 7   | シタラビン( )mg + 5%ブドウ糖250ml | 3時間  |    |     | •  |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| ,   | 手技:静脈内 経路:PM分            | DIV  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    | Ш            |    |
| 8   | 生食 50mL                  |      |    |     |    | 4  |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 0   | 手技: 経路:プライミング用           | IV   |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 9   | ロイナーゼ ( )単位 +5%ブドウ糖250mL | 4時間  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 9   | 手技: 経路:インラインフィルター使用      | DIV  |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 10  | ヘパリンNaロックシリンジ 1本         |      |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    |              |    |
| 10  | 手技: 経路:終了時               | IV   |    |     |    |    |       |    |   |     |     |    |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |      |      |      |    | $oxed{oxed}$ |    |