

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	042	CODE	004005001042
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Ph(-)B-ALL213 C2		
申請年月日	令和3年9月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	3000 mg/m ²
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1.3 mg/m ²
ロイナーゼ	DIV	10000 単位/m ²
ロイケリン	経口	25 mg/m ²
ロイコボリン	IV	15 mg/m ² (初回:50mg/body)

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ロイケリン散()mg 手技:経口 経路: 経口			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	グラニセトロンバック 50mL 手技:静脈内 経路: DIV	30分		●														●													
3	オンコビン()mg + 生食50ml 手技:静脈内 経路: DIV	15分		●														●													
4	メソトレキセート()mg + 生食500ml 手技:静脈内 経路: CIV	24時間		●														●													
5	ソルデム3A 1000mL + ソルデム1 1000mL 手技:静脈内 経路: CIV	24時間		●														●													
6	ロイコボリン ()mg (※ 初回のみ50mg/body) 手技:静脈内 経路:MTX開始36hr後から6hr毎に8回 IV					①	④	③																							
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用 IV						●																								
8	ロイナーゼ()U +注射用水 +5%ブドウ糖250mL 手技:静脈内 経路:1Vを注射用水5mLで溶解、フィルター付の輸液セットを使用 DIV	4時間					●																								
9	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路:点滴後 IV						●																								
10	手技: 経路:																														