化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	045	CODE	004005001045
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Ph(+)ALL213 強化地固め療法		
申請年月日	令和 3 年 9月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
プレドニン	p.o.	60 mg/㎡
スプリセル（1日1回）	p.o.	100 mg/body
オンコビン（MAX 2mg）	DIV	1.3 mg/㎡
ダウノマイシン	DIV	45 mg/㎡
エンドキサン	DIV	1200 mg/㎡
髄注	IT	MTX 15mg +DEX 3.3mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与スケジュール: （ 投 休 ） or （投与間隔 日）《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Total時間入力	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	プレドニン （ ）mg 手技:経口 経路:	1日3回 内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※21日間後、7日で漸減 ●	●	●	●	●	●	●	
2	スプリセル 100mg 手技:経口 経路:	1日1回 内服					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※day4～31(計4週間) ●	●	●	●	●	●	●	●
3	グラニセトロンバッグ 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●					●							●							●							
4	オンコビン （ ）mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●							●							●							●							
5	ダウノマイシン （ ）mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●	●	●																										
6	エンドキサン （ ）mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了	3時間 DIV		●																												
7	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:	6時間 DIV		●																												
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●	●	●					●							●							●							
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															

レジメ検討委員会