

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	046	CODE	004005001046
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Ph(+)-ALL213 C1		
申請年月日	令和 3 年	9月6日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	100 mg/m <sup>2</sup>
メソトレキセート	DIV	900 mg/m <sup>2</sup>
シタラビン (AM分)	DIV	2000 mg/m <sup>2</sup>
ソルメドロール (AM分)	IV	50 mg/body
シタラビン (PM分)	DIV	2000 mg/m <sup>2</sup>
ソルメドロール (PM分)	IV	50 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

※ ST合剤・PPI: 前々日(day-2)、MTX開始48時間前より休薬

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 日) 《 4 》 クール

ロイコボリン投与終了後より再開

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間	日																																
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路: AM分 (12時間間隔)	30分	DIV		●	●	●																													
2	ソルメドロール ( )mg 手技: 静脈内 経路: AM分 (12時間間隔)		IV		●	●	●																													
3	メソトレキセート ( )mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路: アセタゾラミド併用	1時間	DIV		●																															
4	メソトレキセート ( )mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	23時間	DIV		●																															
5	シタラビン ( )mg +5%Glu 250mL 手技: 静脈内 経路: AM分 (12時間間隔)	3時間	DIV			●	●																													
6	グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路: PM分 (12時間間隔)	30分	DIV				●	●																												
7	ソルメドロール ( )mg 手技: 静脈内 経路: PM分 (12時間間隔)		IV		●	●	●																													
8	シタラビン ( )mg +5%Glu 250mL 手技: 静脈内 経路: PM分 (12時間間隔)	3時間	DIV				●	●																												
9	ロイコボリン ( )mg 手技: 静脈内 経路: MTX開始36時間後より6時間間隔で計8回		IV				①	④	③																											
10	スプリセル 100mg 手技: 経口 経路:	1日1回	内服						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※ day4~24 (計3週間)
11	ソルデム1 500mL +7%メイロン 40mL 手技: 静脈内 経路: 6時間間隔	6時間	DIV		④	④	④																													