

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	047	CODE	004005001047
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Ph(+)ALL213 C2		
申請年月日	令和 3 年	9月6日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
プレドニン	p.o.	60 mg/m ²
スプリセル(1日1回)	p.o.	100 mg/body
オンコビン(MAX 2mg)	DIV	1.3 mg/m ²
ダウノマイシン	DIV	45 mg/m ²
エンドキサン	DIV	1200 mg/m ²
髄注	IT	MTX 15mg +DEX 3.3mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 日) 《 4 》 クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間																																									
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
1	プレドニン ()mg 手技:経口 経路: 1日3回 内服			●	●	●	●	●	●	●	※	day1~7、7日間で漸減																																
2	スプリセル 100mg 手技:経口 経路: 1日1回 内服				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	※	day2~22(計3週間)											
3	グラニセトロンバッグ 50mL 手技:静脈内 経路: 30分 DIV			●																																								
4	オンコビン ()mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路: 15分 DIV			●																																								
5	ダウノマイシン ()mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路: 60分 DIV			●																																								
6	エンドキサン ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了 3時間 DIV			●																																								
7	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路: 6時間 DIV			●																																								
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路: IV			●																																								
9	手技: 経路:																																											
10	手技: 経路:																																											