

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	051	CODE	004005001051
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	T-ALL213-O C1		
申請年月日	令和3年5月26日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シタラビン(AM分)	DIV	2000 mg/m <sup>2</sup>
シタラビン(PM分)	DIV	2000 mg/m <sup>2</sup>
エトポシド	DIV	100 mg/m <sup>2</sup>
デキサート	DIV	33 mg/m <sup>2</sup>
髄注	it	
MTX 15mg + AraC 40mg + DEX 3.3mg		

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: AM分	30分 DIV		●	●	●																								
2	シタラビン( )mg + 5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路: 12時間毎(AM分)	3時間 DIV		●	●	●																								
3	エトポシド( )mg + 生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●																								
4	デキサート 33mg + 生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●																								
5	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: PM分	30分 DIV		●	●	●																								
6	シタラビン( )mg + 5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路: 12時間毎(PM分)	3時間 DIV		●	●	●																								
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																										
8	メトレキセート 15mg + キロサイド 40mg + デキサート 3.3mg 手技: 髄腔内 経路:	IT		●																										
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													