

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ATL】成人T細胞白血病		
No(3桁)	005	CODE	004006001005
診療科	内科	医師	堤
セット名称	LSG15-A(THP使用)		
申請年月日	平成21年9月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	350 mg/m ²
ピノルビン	DIV	40 mg/m ²
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1 mg/m ²
プレドニン(Day1)	p.o	40 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	プレドニン()mg (朝 -昼 -夕 錠) 手技:経口 経路:	経口		●																											
2	グラニセロンバック 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
3	生食50mL+オンコビン()mg 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
4	5%ブドウ糖100mL+ピノルビン()mg 手技:静脈内 経路:30分以上で,希釈後6時間以内に投与終了すること	30分 DIV		●																											
5	生食250mL+エンドキサン()mg 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV		●																											
6	ソルデム3A 1000mL 手技:静脈内 経路:	6時間 DIV		●																											
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														