化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー									
適応	【HL】オ	ンパ腫										
No(3桁)	003	CODE	004011001003									
診療科	内科	医師	堤									
セット名称	AB	HP)										
申請年月日	平原	平成21年7月7日										
緊急		通常	•									

抗癌剤名称	手技	標準	基投 与量
ピノルビン	DIV	25	mg/m²
ブレオ(15mgまで)	DIV	10	mg/m²
エクザール(10mgまで)	DIV	6	mg/m²
ダカルバジン	DIV	375	mg/m²

Aポート Vポート	末梢		確認	
		医師	看護師	薬剤師

			1	投与	スク	ァジ.	<u></u>	ル:	:	(投			休)	or	(Ir	nter	val	日数	数		ı	日)	«		> !	-	ル
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 2	26 2	27 2	8
1	グラニセトロンバック 50mL	30分																													7
ľ	手技:静脈内 経路:	DIV																													
2	ピノルビン()mg + 5%ブドウ糖100mL	30分																													1
2	手技:静脈内 経路:希釈後6時間以内に投与終了すること	DIV																													
3	ブレオ()mg + 生食50mL	15分		•																											1
3	手技:静脈内 経路:	DIV																													
4	エクザール()mg + 生食50mL	15分																													1
	手技:静脈内 経路:	DIV																													
5	ダカルバジン()mg + 注射用水 + 生食500ml	3時間								- 1																					
	手技:静脈内 経路:100mgをワッサー10mLで溶解	遮光でDIV								╛																			\perp		
6	ソルデム3A 1000mL	6時間		•						- 1																					
U	手技:静脈内 経路:	DIV																												\perp	
7										- 1																					
,	手技: 経路:									Ц																		\bot	\perp	\perp	╛
8										- 1																					
	手技: 経路:									┙																		\bot	\perp	\bot	╛
9										- 1																					
	手技: 経路:				Щ					Ц																\perp	\perp	\perp	\downarrow	\downarrow	╛
10																															
	手技: 経路:																													\perp	