

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【HL】ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	006	CODE	004011001006
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	☆IGEV		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イホマイド	DIV	2000 mg/m ²
ゲムシタビン	DIV	800 mg/m ²
ロゼウス	DIV	20 mg/m ²
プレドニン(Day1~4)	p.o	100 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	プレドニン錠 (朝 - 昼 - 夕) 手技: 経口 経路:	経口		●	●	●	●																								
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●																								
3	イホマイド()mg + 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了すること	2時間 DIV		●	●	●	●																								
4	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: イホマイドと同時に投与	30分 DIV		●	●	●	●																								
5	ゲムシタビン()mg + 生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●			●																								
6	ロゼウス()mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																											
7	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●																								
8	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: イホマイドの4時間後に投与	30分 DIV		●	●	●	●																								
9	ウロミテキサン()mg + 生食 50mL 手技: 静脈内 経路: イホマイドの8時間後に投与	30分 DIV		●	●	●	●																								
10	ヘパリンNaロックシシンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV						●																							