

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【HL】ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	011	CODE	004011001011
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	A+AVD		
申請年月日	平成31年1月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ドキシソビシン	DIV	25 mg/m <sup>2</sup>
エクザール(10mgまで)	DIV	6 mg/m <sup>2</sup>
ダカルバジン	DIV	375 mg/m <sup>2</sup>
アドセトリス	DIV	1.2 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 28 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用	IV		●																												
2	ドキシソビシン( )mg + 生食 100mL 手技: 静脈内 経路: グラニセトロンゼリー服用	30分 DIV		●																												
3	エクザール( )mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																												
4	ダカルバジン( )mg + 注射用水 + 生食500mL 手技: 静脈内 経路: 1VをDW10mLで溶解	3時間 遮光でDIV		●																												
5	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																												
6	アドセトリス( )mg + 生食150mL + 注射用水40mL 手技: 静脈内 経路: ダカルバジン投与後1hr以内に開始	30分 DIV		●																												
7	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																												
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																												
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															