

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	010	CODE	004012001010
診療科	内科	医師	堤
セット名称	70%CHOP(EPI使用)		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	500 mg/m ²
エピルビシン	DIV	50 mg/m ²
オンコビン(MAX2mg)	DIV	1 mg/m ²
プレドニン	p.o	30 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	プレドニン錠5mg()錠(朝 -昼 -夕 錠服用) 手技: 経路:	食後 p.o		●	●	●	●	●																						
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																										
3	生食50mL+オンコビン()mg 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																										
4	生食100mL+エピルビシン()mg 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●																										
5	生食250mL+エンドキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV		●																										
6	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●																										
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																										
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													