

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	012	CODE	004012001012
診療科	内科	医師	堤
セット名称	THP-COP-E		
申請年月日	平成21年8月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オンコビン	DIV	1 mg/m ²
ピノルビン	DIV	30 mg/m ²
エンドキサン	DIV	500 mg/m ²
プレドニン	p.o	30 mg/m ²
エトポシド	DIV	100 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	プレドニン錠 毎食後(朝 錠-昼 錠-夕 錠) 手技: 経路: p.o			●	●	●	●	●																							
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: DIV	30分		●	●	●	●																								
3	生食50mL+オンコビン()mg 手技: 静脈内 経路: DIV	15分		●																											
4	5%ブドウ糖100mL+ピノルビン()mg 手技: 静脈内 経路: 希釈後6時間以内に投与終了すること DIV	30分		●																											
5	生食250mL+エンドキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事 DIV	2時間		●																											
6	生食250mL+エトポシド()mg 手技: 静脈内 経路: DIV	2時間		●	●	●	●																								
7	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路: DIV	6時間		●	●	●	●																								
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: IV			●	●	●	●																								
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														