

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	014	CODE	004012001014
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★A+CHP		
申請年月日	令和2年1月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アドセトリス	DIV	1.8 mg/kg
ドキシソルビシン	DIV	50 mg/m <sup>2</sup>
エンドキサン	DIV	750 mg/m <sup>2</sup>
プレドニン	p.o	100 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: ( 1 投 2 休 ) or (Interval日数 21 日) 《 6~8 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	プレドニン錠20錠 毎食後(朝 錠-昼 錠-夕 錠) 手技: 経路: p.o			●	●	●	●	●																							
2	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用 DIV			●																											
3	生食100mL+ドキシソルビシン( )mg 手技: 静脈内 経路: グラニセトロンゼリー服用 DIV	30分		●																											
4	生食250mL+エンドキサン( )mg 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事 DIV	2時間		●																											
5	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: DIV	30分		●																											
6	アドセトリス( )mg + 生食150mL + 注射用水40mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後濃度0.4~1.2mg/mL DIV	30分		●																											
7	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: DIV	15分		●																											
8	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路: DIV	6時間		●																											
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: IV			●																											
10	手技: 経路:																														