

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	016	CODE	004012001016
診療科	内科	医師	堤
セット名称	R-bendamustine(2Days: 90mg/m <sup>2</sup> )		
申請年月日	平成30年3月9日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキシマブ	DIV	375 mg/m <sup>2</sup>
トレアキシン	DIV	90 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: ( 1 投 3 休 ) or (投与間隔 28 日)《 6 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/グラネセトロンゼリー服用	IV		●	●																										
2	トレアキシン ( )mg+ 注射用水 +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後3hr以内に終了する	1時間 DIV		●	●																										
3	クロルフェニラミン錠 1錠+カロナール200mg 4錠+レバミピド 1錠 手技: 経路: リツキシマブの約30分前に	p.o		●																											
4	生食 50mL 手技: 経路: プライミング用			●																											
5	リツキシマブ ( )mg+生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 前投薬の30分後に開始する/1mg/mLに希釈する	右記参照 DIV		●																											
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●																										
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														