

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	018	CODE	004012001018
診療科	内科	医師	堤
セット名称	EPOCH		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	50 mg/m <sup>2</sup>
オンコピン	DIV	0.4 mg/m <sup>2</sup>
ドキシソルビシン	DIV	10 mg/m <sup>2</sup>
エンドキサン	DIV	750 mg/m <sup>2</sup>
プレドニン	経口	60 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 15 日) 《 》 クール																														
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	プレドニン錠 毎食後(朝 錠-昼 錠-夕 錠) 手技: 経路: p.o			●	●	●	●																										
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: DIV	30分		●	●	●	●																										
3	エトポシド( )mg+オンコピン( )mg+ドキシソルビシン( )mg+生食500mL 手技: 静脈内 経路: CIV	24時間		●	●	●	●																										
4	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路: CIV	24時間		●	●	●	●																										
5	エンドキサン( )mg+生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事 DIV	3時間						●																									
6	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路: DIV	6時間						●																									
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: IV							●																									
8	手技: 経路:																																
9	手技: 経路:																																
10	手技: 経路:																																