

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	019	CODE	004012001019
診療科	内科	医師	堤
セット名称	EPOCH(THP)		
申請年月日	平成26年2月13日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	50 mg/m ²
オンコピン	DIV	0.4 mg/m ²
ピノルビン	DIV	10 mg/m ²
エンドキサン	DIV	750 mg/m ²
プレドニン	経口	60 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (1 投 2 休) or (Interval日数 21 日)《 8 》クール																													
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	プレドニン錠 毎食後(朝 錠-昼 錠-夕 錠) 手技: 経路: p.o			●	●	●	●	●																		●	●	●	●	●		
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: DIV	30分		●	●	●	●	●																		●	●	●	●	●		
3	エトポシド()mg+オンコピン()mg+ピノルビン()mg+5%ブドウ糖500mL 手技: 静脈内 経路: CIV	24時間		●	●	●	●																			●	●	●	●			
4	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路: CIV	24時間		●	●	●	●																			●	●	●	●			
5	エンドキサン()mg+生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事 DIV	3時間						●																					●			
6	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路: DIV	6時間						●																					●			
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: IV							●																					●			
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															