

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	022	CODE	004012001022
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★CMR+D		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキサシ	DIV	375 mg/m ²
ロイスタチン	DIV	0.09 mg/kg
ノバントロン	DIV	6or10 mg/m ²
デキサート	DIV	20 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	ネオマレルミンTR1錠+カロナール200mg4錠+ムコスタ1錠 手技: 経路:リツキシマブの約30分前に p.o			●																												
2	生理食塩水 50mL 手技: 経路:プライミング用			●																												
3	リツキシマブ()mg+生食500mL 手技: 静脈内 経路:前投薬の30分後に開始する	右記参照 DIV		●	投与速度100ml/hrで開始し1時間後に200とする。生食で1mg/mLに希釈する。																											
4	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●																												
5	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV			●	●	●	●	●																							
6	デキサート 33 mg+生食100mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV			●	●	●																									
7	ノバントロン()mg+生食100mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV			●																											
8	ロイスタチン()mg+生食250mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV			●	●	●	●	●																							
9	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV			●	●	●	●	●																							
10	生食20mL 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●																								